

REET MAINS | अध्यापक भर्ती

सभी प्रकार के

बालुका स्तूप
— और —

अर्द्ध शुष्क मरुस्थल



Concept + याद करने की गारंटी



Class

9

बालुका स्तूप युक्त प्रदेश - 58.50% ✓

बालुका स्तूप

- रेत के टीले
- पवन द्वारा रेत के निक्षेपण (जमाव) द्वारा निर्मित रेत के टीले।

धोरे

- ↳ लहरदार रेत के टीले

धरियन

- ↳ अतिशील रेत के टीले probability
- ↳ स्थानीय लोग रेत के टीलों को धरियन कहते हैं।

1.

रेखा के समान अनुदैर्घ्य/रेखीय बालुका स्तूप

- हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप
- ऊँचाई 10 से 60 मीटर तक
- सर्वाधिक विस्तार - जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, सुरतगढ़ आदि में

हरीगंगानगर

अनुप्रस्थ बालुका स्तूप

→ समकोण → 90°

- वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप
- ऊँचाई - 10 से 40 मीटर तक
- सर्वाधिक - जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा व बीकानेर में।


1 फरवरी

दो धौरो के मध्य का मार्ग गासी था
कारखा कहलाता है

पवन की दिशा

अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप


दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व (मधिनारा)



→ इसमें पवनानुवर्ती ढाल → 9° से 14° तक

→ अवरोध

अनुप्रस्थ बालुका स्तूप-



अवरोध बालुका स्तूप

इन दो स्तूपों के मध्य 500-1000 मीटर तक

का जप देखा जा सकता है

बरखान/बरछान

→ निर्माण वायु भंवर / सिंगनुमा



- अर्द्धचंद्राकार बालुका स्तूप / कटेरेनुमा { सबसे ज्यादा mobility
- सर्वाधिक गतिशील, नवीन बालू युक्त व सर्वाधिक नुकसानदेयी
- ऊँचाई - 10 से 20 मीटर, चौड़ाई - 100 से 200 मीटर
- सर्वाधिक - शेखावाटी में { धुरु का भालेरी क्षेत्र और सीकर का मधा नदी क्षेत्र इसके लिये जाना जाते हैं

पेराबोलिक बालुका स्तूप

P → Pin → सिर केपिन की आकार

- महिलाओं के बालों की पिन के आकार के बालुका स्तूप
- मरुस्थली वनस्पति की सहयोग से निर्मित बीकानेर में सर्वाधिक

↳ बहुमुखी बालुका स्तूप



सीफ़

→ अनुरैर्धर्ष बालुका स्तूप का भाग

- विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालुका स्तूप की श्रृंखला का बीच बीच से कट जाना ।

सब्र कापिस स्तूप

→ नेवखां | लुनेट | झुँचाई → 5 मीटर

छोटी झाड़ियों व मंद पवन गति से निर्मित बालुका स्तूप | सर्वाधिक → चीकानेर

तारा बालुका स्तूप

STAR

अस्थिर | असंगठित

- तारे (STAR) के आकार के बालुका स्तूप

- सर्वाधिक - मोहनगढ़, पोकरण व सूरतगढ़



- बालसन → मरुस्थल के पहाड़ी भाग की निम्न भूमि पर जल एक्जिट हो जाता है और इस से बनी झील बालसन कहलाती है।
- सेलीनास → मुलायम लवण की परतयुक्त झील। अत्यधिक खारी झील।
- तल्ली → मरुस्थल में मीठे पानी के छोटे छोटे गड्ढे/खड्डे।
- मरहो → तल्ली के सूखने के बाद बची हुई मिट्टी।
- नाड़ी → दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गांव से बाहर बना हुआ छोटा जालाब।
- नाड़ी का टोबा → नाड़ी का सबसे गहरा भाग।

प्लाया → मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलो/ दो बालुका स्तूपों के मध्य पानी जमा होने से निर्माण। पालीवाल प्रायद्वीपों के कारण

• बड़ादा प्लाया के निकट पर्वतीय क्षेत्र की निम्न भूमि। कंकड - पत्थर नाम प्लाया प्लाया में एकत्रित पानी।

• रन/टाट → प्लाया झीलो का खदली क्षेत्र में बदल जाना।
→ इसे टाट भी कहते हैं इसकी प्रकृति भी खारी होती है।

• खड़ीन → तल्ली/पोखर के सूखने के बाद पीछे की स्थिति।
→ परम्परागत हनीकट। सर्वाधिक - जैसलमेर

• पीवना → मरुस्थल में पाया जाने वाला विषैला सर्प।

• आगोर → मरुस्थल के घरो में दलान देकर वर्षा जल को संग्रहित करना।

प्रमुख रण या टाट

जैसलमेर → पोकरण, लवा

वरमसर, भाकरी

कलीदी → वाप

बालोतरा → थोब

बाड़मेर → रेड़ाना

पुर → तालछापर

• मरुस्थल का मार्च → मरुस्थल का धीरे धीरे बढ़ना।

→ रेगंती मृत्यु

→ विस्तार → हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात

→ सर्वाधिक हरियाणा।

→ अरावली के अजमेर-मेरवाड़ा जगह से अधिक विस्तार

→ दिशा → दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर

→ सर्वाधिक प्रभावित गाँव → नाचना (जैसलमेर)


इसके विस्तार में
वरखान बालुका
स्तूपों का सर्वाधिक
योगदान है।

• अर्द्धशुष्क मरुस्थल

- 25 से 50 सेमी औसत वर्षा वाला क्षेत्र

इसे 4 भागों में बाँटा गया है

1. घग्घर का मैदान
2. शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र
3. नागौरी उच्च भूमि
4. लूनी बेसिन/गोडवाड़ प्रदेश



(A) घग्घर का मैदान

- यह श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ।
- यह घग्घर नदी का अपवाह क्षेत्र हैं।
- 'काठी/बग्गी' - इस बेसिन में पायी जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी, जिसका विस्तार गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में हैं।



(B) शेखावाटी अंतर्वर्ती क्षेत्र (बांगर)

- इसका विस्तार सीकर, चुरु, झुंझुनूं जिलों में है।
- यह कांतली नदी का आंतरिक अपवाह क्षेत्र है।
- यहाँ की मृदा चूनेदार अधः स्तर से आवृत है।
- यहाँ कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं।
- बालुका स्तूप - अनुप्रस्थ व बरखान प्रकृति के देखने को मिलते हैं।

तेरावारी
बेलिन

जोहड़ का गहरा
भाग छोड़ी कहलाता है

कांतली नदी

शेखावाटी
अंतर्वर्ती क्षेत्र
(बांगर)

झुंझुनूं

चुरु

सीकर

बालुका स्तूप

जोहड़


अनुप्रस्थ बालुका स्तूप

बरखान बालुका स्तूप



(C) नागौर उच्च भूमि प्रदेश


- इसका विस्तार नागौर जिले के लूणी बेसिन व शेखावाटी प्रदेश के मध्य देखने को मिलता है।
- यहाँ की मृदा लवणीय है तथा सोडियम क्लोराइड (NaCl) के कणों की उपस्थिति के कारण यहाँ खारे पानी की झीलें अधिक हैं- जैसे- डीडवाना, डेगाना, कुचामन व नावाँ आदि।
- कूबड़ पट्टी / बांका पट्टी - नागौर व अजमेर के मध्य स्थित मृदा लवणीय क्षेत्र को कूबड़ पट्टी/बांका पट्टी कहा जाता है, जिसके कारण फ्लोरोसिस बीमारी होती है।



डीडवाना झील



डेगाना झील




कुचामन झील




कूबड़ पट्टी / बांका पट्टी

(D) लूणी बेसिन या गोडवाड प्रदेश


- इसका विस्तार पाली, जालौर व सिरोही जिलों तक है।
- यह लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र है।
- इसमें ग्रेनाइट पहाड़ियाँ, जालौर पहाड़ियाँ व सिवाणा हिल्स स्थित हैं।
- काला भूरा डुंगर - इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ।
- इस भू-क्षेत्र की वनस्पति - बबूल, फोग, खेजड़ा, कैर, बेर व सेवण घास आदि हैं, क्योंकि ये मरुस्थलीय वनस्पतियाँ हैं।
- प्रमुख फसलें मोठ, बाजरा तथा ग्वार सभी खरीफ फसलें हैं। बाजरा मोठ, ग्वार आदि का सर्वाधिक उत्पादन भी इन्हीं क्षेत्र में होता है।




ग्रेनाइट पहाड़ियाँ



जालौर पहाड़ियाँ



सिवाणा हिल्स



काला भूरा डुंगर
(पाली)



प्रमुख वनस्पति

बबूल

फोग

खेजड़ा

कैर

बेर

सेवण घास



प्रमुख फसलें (खरीफ)

मोठ

बाजरा

ग्वार



“Join Our Official TELEGRAM CHANNEL,”



TO Get NEW UPDATES !



- New Job Alerts
- Academic News
- Class PDFs
- Practice MCQ Questions & Many More

@<https://t.me/gouravgyandhara>

Join Now!





JOIN THE FASTEST GROWING EDUCATION PLATFORM



निःशुल्क व नियमित शिक्षा देने में
राजस्थान का **न. 1 YOUTUBE CHANNEL**